



**ESTUDO MORFOLÓGICO COMPARATIVO DAS SEIS ESPÉCIES DO  
GÊNERO CHIRONIUS (FITZINGER 1826) DISPONÍVEIS NA COLEÇÃO DO  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS BIOLÓGICAS (CEPB) DA  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS.**

BRUNA REBECA LÔBO; MATHEUS GODOY PIRES

[bruna\\_rebecca@hotmail.com](mailto:bruna_rebecca@hotmail.com)

O gênero *Chironius* compreende as dezesseis espécies de serpentes neotropicais notáveis por serem as únicas espécies do Novo Mundo com dez ou doze fileiras de escamas dorsais no meio do corpo. Áglifas, terrestres e arborícolas, das dez espécies que ocorrem no Brasil, seis são representadas na coleção herpetológica do Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas da PUC-Goiás (CEPB) (*Chironius carinatus*, *C. exoletus*, *C. flavolineatus*, *C. fuscus*, *C. quadricarinatus* e *C. scurrulus*). O presente estudo objetiva elucidar a variação morfológica intra e interespecífica entre essas espécies disponíveis na coleção do CEPB por meio da análise e caracterização de caracteres morfométricos, merísticos, esqueléticos, de morfologia genital e do padrão de coloração. No presente momento, 177 espécimes de cinco das espécies representadas (*Chironius exoletus*, *C. flavolineatus*, *C. fuscus*, *C. quadricarinatus* e *C. scurrulus*) tiveram sua morfologia externa analisada em certo grau, produzindo resultados preliminares interessantes, os quais permitem vislumbrar certos aspectos variacionais distintivos para os táxons analisados.

**Palavras-chave:** Serpentes. Colubridae. *Chironius*. Variação. Morfologia.