Anais do Semana de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás 2014
Disponível em: http://pucgoias.edu.br/ucg/prope/pesquisa/anais/2015/index.htm
ISSN: 2177-3327

COLETA DE DADOS CLÍNICOS, HISTOPATOLÓGICOS, IMUNOHISTOQUÍMICOS E PROGNÓSTICOS DE PACIENTES COM CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE MAMA NÃO TRIPLO NEGATIVO SELECIONADOS NO LABORATORIO DE IMUNOHISTOQUIMICA DO HOSPITAL ARAUJO JORGE NO PERIODO DE 2005 A 2007

ESTHER DE PAIVA MOTA; VERA APARECIDA SADDI; THALLES EDUARDO DIAS DOS SANTOS; PEDRO PERILLO MAGALHÃES DE SÁ; GABRIEL BORGES VEADO DE ASSIS; GABRIELA MOURA DE PAULA

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O câncer de mama é o mais frequente em mulheres e representa a segunda principal causa de morte por câncer neste grupo (Sandhuet al., 2010). O objetivo do trabalho é, portanto, identificar, por meio de coleta de dados e análise estatística de cerca de 150 casos de câncer de mama não triplo negativo, selecionados a partir dos registros do Setor de Anatomia Patológica do Hospital Araújo Jorge, os principais fatores prognósticos e preditivos relacionados aos cânceres de mama não triplo negativos. METODOLOGIA A partir dos livros de registro do Setor de Anatomia Patológica do Hospital Araújo Jorge, foram identificados os casos de câncer de mama diagnosticados em 2007, com diagnóstico histológico comprovado. A partir deste diagnóstico, foi feita a coleta de dos dados dos prontuários de pacientes com perfil não triplo negativo, com posterior confecção do banco de dados e análise descritiva. RESULTADOS Foram analisados 238 prontuários de pacientes diagnosticadas com câncer de mama em 2007, sendo 43 com o perfil prognóstico TN e 132 NTN. Os 63 restantes foram excluídos do estudo. Os dados a seguir se referem às 132 pacientes com perfil NTN. Em relação à idade, foram avaliadas pacientes de 16 a 83 anos, com média de 53,78, sendo que 112 se encontram no grupo com mais de 35 anos. Quanto à história familiar, a maioria de 95 não tinha familiares com neoplasia de mama. Avaliadas quanto ao status menstrual, 40 pacientes se encontrava na menacme e 71 na menopausa. 22 pacientes referiram uso de anticoncepcional oral, enquanto 25 negaram. Dentre as pacientes avaliadas, 53 amamentaram por algum período, em contrapartida, 21 referiram não ter amamentado. Quanto ao número de metástases linfonodais, 41 pacientes possuíam algum acometimento de linfonodos e 71 não possuíam. As metástases à distância foram também avaliadas e apenas 3 pacientes do grupo dos NTN possuiam metástases á distância, enquanto 101 não possuíam. O tratamento neoadjuvante foi realizado em 24 pacientes, não sendo referido em 94 casos. O tratamento cirúrgico foi também considerado em nossa análise, 126 pacientes foram submetidas a ele, enquanto apenas 1 não foi. O estadiamento clínico do tumor foi informada em pouco mais da metade dos prontuários. 9 pacientes se encotravam em estadiamento clínico T1, 39 em estadiamento T2, 16 em T3 e 8 em T4. Quanto à mortalidade, foi encontrada a proporção de 9 de óbitos confirmados para 123 com este dado negativo.CONCLUSÃO É visível que o perfil prognóstico NTN apresenta baixa mortalidade, baixa incidência de metástases e boa resposta ao tratamento local cirúrgico. Contudo, os resultados apresentados neste relatório serão complementados pelos resultados da análise dos 43 casos TN, obtidos dentro do mesmo projeto, em planos de trabalho distintos do título deste resumo.