



**COLETA DE DADOS CLÍNICOS, HISTOPATOLÓGICOS,
IMUNOHISTOQUÍMICOS E PROGNÓSTICOS DE PACIENTES COM
CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE MAMA DO TIPO TRIPLO-
NEGATIVO EXAMINADOS NO LABORATORIO DE IMUNOHISTOQUÍMICA
DO HOSPITAL ARAÚJO JORGE NO PERÍODO DE 2005 A 2007**

PEDRO PERILLO M D. DE SÁ; VERA APARECIDA SADDI

pedro.perillo@hotmail.com

Dos cerca de um milhão de casos de câncer de mama diagnosticados mundialmente em 2008, estima-se que 17% expressem o fenótipo triplo-negativo(TN). O câncer de mama TN está recebendo uma quantidade enorme de atenção das pesquisas, dada à sua biologia única, o mau prognóstico, o padrão inicial de metástase agressivo e a relativa falta de alvos terapêuticos, quando comparado com o câncer de mama endócrino-sensível e HER2-positivo (Carey et al., 2009). O presente estudo coletou e comparou os dados clínicos, histopatológicos, imunohistoquímicos e prognósticos de pacientes com carcinomas ductais de mama TN e não TN(NTN). As informações coletadas foram computadas em banco de dados no aplicativo Excel. Foram selecionados, a partir dos registros do Setor de Anatomia Patológica do Hospital Araújo Jorge(HAJ), 238 casos de câncer de mama analisados por imunohistoquímica no ano de 2007, sendo, 175 prontuários localizados. Dentre os 175, 43 eram TN e 132 NTN. Aqueles não localizados no HAJ totalizaram 63, correspondendo a pacientes com tumores analisados no laboratório de imunohistoquímica, mas tratadas em outras instituições. A análise referente à pacientes TN, mostra: 48% casadas, 10(23%) solteiras, 12(28%), outros estados civis. 6(14%) possuíam menos de 35 anos, 37(86%), idade maior ou igual a 35 anos. 8(18%) possuíam história familiar positiva, 32(74%), não apresentou relato da doença na família, 3(8%), não tiveram informação registrada(NR). Em menacme, 16 (37%), na menopausa, 17 (39%), e 10 (24%) NR. 4(9%) usaram ACO, 7 (16%) não, 32(74%) NR. 9(20%), eram tabagistas, 27(62%) não, e 7 NR. 20(46%), amamentaram, 5(11%) não, 18(43%)NR. 5(11%) estavam em T1, 11(25%) em T2, 12(27%) em T3, 5(11%) em T4 e 10(23%) NR. 14(32%) apresentaram metástase em linfonodos, 28(66%) não, e 1(2%) NR. Não houveram registros de metástase a distancia. 41(95%), receberam tratamento cirúrgico, 2(4%) NR. 16(37%) receberam tratamento neoadjuvante, 25(58%) não, 2 (5%) NR. Os dados sobre exposição a hormônios femininos consistem com o firmado em literatura. Achados referentes à idade, história familiar, amamentação e complicações, entretanto, destoaram da literatura.

Palavras-chave: Câncer de Mama. Triplo-Negativos. Prognóstico.