Anais do Semana de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás 2014
Disponível em: http://pucgoias.edu.br/ucg/prope/pesquisa/anais/2015/index.htm
ISSN: 2177-3327

AÇÃO DA VARFARINA EM PACIENTES PORTADORES DE FIBRILAÇÃO ATRIAL

VIRGINIA LOPES DE SOUZA MATOS; GIULLIANO GARDENGHI
virginiamatos@gmail.com

Introdução: A Fibrilação Atrial (FA) é uma arritmia frequente na prática clínica e comum em adultos, com o avanço da idade superior aos 60 anos ocorre uma maior prevalência da mesma, aumentando esse número em 2% a cada década, sendo que no Brasil 1,5 milhões de pacientes apresentam a doença. É caracterizada por uma desordem na função mecânica dos átrios, causando assim a taquiarritmia de alta prevalência. Durante a FA há uma irregularidade no controle de frequência cardíaca ventricular, por não haver um ciclo determinando a chegada normal de estímulos ao nó atrioventricular. Entre suas principais causas estão o envelhecimento, doenças cardíacas coronárias e valvares de origem reumática e não-reumática, hipertensão e diabetes. Considera-se em alguns estudos que a FA está associada ao acidente vascular cerebral (AVC), representando crescentemente um problema de saúde pública, uma vez que a FA é considerada um dos maiores fatores de maior risco para ocorrência de AVC. O objetivo do presente trabalho visou analisar as ações da Varfarina nos pacientes portadores de fibrilação atrial. Resultados e conclusão: É nítido que os pacientes com FA sofrem alterações importantes, e a mesma é responsável pelo aumento de internações hospitalares, cuidados intensivos, morbidez e até a mortalidade em longo prazo. Porém felizmente hoje há a disponibilidade de novos fármacos alternativos, apresentando melhores eficácias e baixos efeitos colaterais e espera-se que num futuro próximo tenhamos disponível uma variedade de propostas para com fármacos novos, com sua eficácia superior aos que estão presentes hoje no mercado.

Palavras-chave: Fibrilação Atrial. Varfarina. Dermatan Sulfato. Anticoagulantes. Cirurgia Torácica.