



## **ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE UM GRUPO DE INDIVÍDUOS DIAGNOSTICADOS COM CARCINOMA DE CAVIDADE ORAL EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE GOIÂNIA**

ANA KAROLINA LOPES; VERA APARECIDA SADDI; JODIÊ DO AMARAL SODÁRIO COSTA; JODIÊ DO AMARAL SODÁRIO COSTA; NATHÁLIA NOGUEIRA DO AMARAL; JÉSSICA CÁCERES MARTINS  
lopesanakarolina@gmail.com

**Objetivo:** Relacionar os aspectos clínicos patológicos de indivíduos diagnosticados com câncer e cavidade oral associando esses dados ao uso do tabaco. **Método:** Foram incluídos 135 casos de carcinoma de cavidade oral selecionados a partir dos prontuários de pacientes diagnosticados no período entre os anos de 2005 e 2006, no hospital Araújo Jorge, Goiânia-Go. Após a coleta de dados, foram realizadas análises dos dados epidemiológicos. **Resultados:** Dos 135 casos incluídos no estudo, 74,8% são do sexo masculino e 25,2% são do sexo feminino. Os estadiamentos tumorais III e IV foram os mais prevalentes, representando 62,4%, bem como os graus tumorais II e III representando 56,3%. Nenhum dos casos apresentou metástase a distância e 43% deles tiveram comprometimento de linfonodos locais. Em relação aos fatores de risco, 82% dos casos eram fumantes e ex-fumantes e, aproximadamente 38% relatou o uso de bebida alcoólica. Ao analisar separadamente, tabagistas e não tabagistas a sobrevida em cinco anos foi de 45% e 69,8%, respectivamente. **Conclusão:** O perfil da população acometida pelo câncer de cavidade oral tem sido claramente definido bem como a influência que as substâncias do tabaco exercem sobre a sobrevida desta população e os resultados deste trabalho corroboraram com esta tendência epidemiológica uma vez que confirmaram a relação entre exposição ao fator de risco e desenvolvimento do carcinoma de cavidade oral.

**Palavras-chave:** Carcinoma De Cavidade Oral. Epidemiologia. Perfil Epidemiológico