



## ALTERAÇÕES DO TEMPO DE PROTROMBINA EM PACIENTES QUE FAZEM USO DE VARFARINA

ISTEURIA CRISTINA PAULA SANTOS; KARLLA GREICK BATISTA DIAS PENNA; JORDANA FARIAS CORRÊA; THAÍS REGINA DOS SANTOS; ANA CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS  
isteuria@gmail.com

**Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar alterações nos níveis de TP em pacientes que fazem uso de medicação anticoagulante oral, realizando comparação entre estes níveis e os valores obtidos em pacientes não anticoagulados. **Método:** Realizou-se estudo analítico observacional longitudinal, onde foram analisados laudos laboratoriais de TP de 103 pacientes, dos quais 5 estavam em terapia anticoagulante oral com o fármaco varfarina (Marevan®) e 96 não faziam uso de anticoagulante oral. **Resultados:** Apenas cinco (4,85 %) dos pacientes estavam em terapia anticoagulante oral. Dos 98 pacientes sem terapia anticoagulante oral, 95 (92,23 %), apresentaram tempo de protrombina dentro dos valores de normalidade e 3 pacientes (2,91%) apresentaram valores acima dos limites de normalidade. **Conclusão:** Os resultados obtidos no presente trabalho demonstraram que os pacientes em terapia anticoagulante oral apresentaram significativa alteração do tempo e atividade da protrombina quando comparados aos pacientes que não fazem uso de medicação anticoagulante oral.

**Palavras-chave:** Tempo De Protrombina. Anticoagulante Oral. Varfarina