



## **INTERCORRÊNCIAS DA SUÇÃO NUTRITIVA NO SEIO MATERNO DE BEBÊS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE AUDITIVA-CRESA/PUC GOIÁS**

ALINE FERREIRA COTA; CEJANA BAIOCCHI SOUZA  
allynne09@hotmail.com

**Objetivo:** Avaliar as intercorrências da sucção nutritiva dos bebês atendidos no CRESA/ PUC Goiás. **Método:** A amostra foi composta por 90 bebês entre 0 e 4 meses, de ambos os gêneros que frequentaram o CRESA – PUC Goiás, encaminhados para a avaliação do frênulo lingual, no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015. Foram excluídos bebês com alterações anatomofisiológicas na face ou com comprometimento neurológico que pudessem interferir na sucção e/ou deglutição. **Resultados:** Na avaliação fonoaudiológica da sucção nutritiva 46(51,1%) bebês apresentaram uma ou mais intercorrências na sucção nutritiva. Verificou-se ritmo de sucção com poucas sucções e pausas longas em 23,9%(n=11) dos bebês, coordenação entre sucção/deglutição/respiração inadequada em 15,2%(n=7), 2,1%(n=1) dos bebês mordiam o mamilo e 80,4%(n=37) apresentaram estalos de língua durante a sucção. **Conclusão:** Conclui-se que as intercorrências da sucção nutritiva dos bebês avaliados foram a presença de estalos de língua durante a sucção, ritmo de sucção com poucas sucções e pausas longas, incoordenação entre sucção/deglutição/respiração e padrão mordedor do mamilo. Casos mais complexos e persistentes requerem diagnóstico e seguimento com profissional com prática em aleitamento materno ou especialista em amamentação, a fim de prevenir o desmame precoce e possíveis alterações de alimentação e de fala.

**Palavras-chave:** Intercorrências. Amamentação. Sucção