



**COLETA DE DADOS CLÍNICOS, HISTOPATOLÓGICOS,
IMUNOHISTOQUÍMICOS E PROGNÓSTICOS DE PACIENTES COM
CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE MAMA NÃO TRIPLO NEGATIVO
SELECIONADOS NO LABORATÓRIO DE IMUNOHISTOQUÍMICA DO
HOSPITAL ARAÚJO JORGE NO PERÍODO DE 2007 A 2008**
ESTHER DE PAIVA MOTA; VERA APARECIDA SADDI
paiva.esther@gmail.com

Objetivo: O objetivo deste trabalho é coletar casos de carcinomas de mama TN e NTN em arquivo no Hospital Araújo Jorge, para análise comparativa dos aspectos prognósticos avaliados, incluindo grau histológico e sobrevida em cinco anos. **Método:** A partir de registros do Hospital Araújo Jorge, foram identificados casos de câncer de mama diagnosticados em 2007, com diagnóstico histológico comprovado. Prosseguiu-se com a coleta de dos dados de 149 prontuários de pacientes com perfil NTN e TN, confecção do banco de dados e análise estatística e descritiva. **Resultados:** Obtivemos o número final de 50 TN e 99 NTN. Em relação à idade, a média foi de 49 anos nas pacientes TN e 55 nas NTN. Foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre TN e NTN em duas variáveis. Quanto ao número de linfonodos acometidos, considerando categorias 0, 1 a 3, 4 a 9, ≥ 10 , foram encontradas porcentagens de 47, 14, 0 e 12% respectivamente entre os TN e 56, 15, 0, 1% entre os NTN ($p=0,0294$). No critério estadiamento, as pacientes foram divididas em estágio I, II, III e IV, com respectivas porcentagens de 40, 8, 48 e 2% entre os casos TN e 50, 35, 22, 11% entre os casos NTN ($p < 0,0001$). Na análise da sobrevida em 5 anos, o óbito foi constatado em 36% das pacientes com carcinoma TN e em 22% das pacientes NTN. **Conclusão:** É visível que o perfil prognóstico dos carcinomas NTN está associado a menor agressividade, menor taxa de metástases, além de ser descoberto em estágios mais iniciais e ter uma maior sobrevida, quando comparado com os carcinomas TN, que denotam maior agressividade.

Palavras-chave: Câncer De Mama. Imunohistoquímica. Triplo Negativo