Anais do II Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás
Disponível em: http://pucgoias.edu.br/ucg/prope/pesquisa/anais/2016
ISSN: 2177-3327

RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

ANDREZA PRESTES DOS SANTOS, CEJANE OLIVEIRA MARTINS PRUDENTE
andrezaprestess@gmail.com

Objetivo: Analisar a qualidade de vida (QV) de pacientes com ELA e correlacionar a capacidade funcional com a QV destes pacientes. **Método:** Estudo transversal, sendo a amostra composta por 27 pacientes com ELA em tratamento em um Centro de Reabilitação e Readaptação de Goiânia. Foram utilizados três instrumentos, sendo uma ficha de perfil sociodemográfico, o Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) e o Medical Outcomes Study 36 - Item Short - Form Health Survey. **Resultados:** Os participantes tinham média de idade de 55.3 anos, sendo a maioria do sexo feminino (59,3%). A média do ALSFRS-R foi de 25.2 ± 8.3; e a do SF-36 abaixo de 70 em todos os domínios. Dos oito domínios do SF-36, quatro tiveram correlação positiva com o ALSFRS-R, sendo estes capacidade funcional ($r=0,75$; $p<0,001$), estado geral de saúde ($r=0,39$; $p= 0,04$), aspectos sociais ($r=0,49$; $p= 0,008$) e limitações por aspectos emocionais ($r=0,44$; $p= 0,02$). **Conclusão:** Indivíduos com ELA apresentam declínio na QV, principalmente em aspectos físicos e capacidade funcional. Pacientes com pior capacidade funcional apresentam pior QV no que se refere à capacidade funcional, estado geral de saúde, aspectos sociais e limitações por aspectos emocionais.

Palavras-chave: Esclerose Amiotrófica Lateral. Qualidade de vida. Atividade motora.